

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

## de Libra 460

**Tamaño:** Medio o grande.

**Forma:** Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrecha, medianamente profunda. Borde liso, a veces ligeramente oblicuo por estar más levantado de un lado. **Pedúnculo:** Longitud y grosor medios. Semi-carnosos, muy engrosado formando una bola carnososa en la base. Ruginoso con lenticelas blanquecinas. Recto. Implantado derecho, bien incrustado en la cavidad.

**Cavidad del ojo:** Amplia, casi superficial. Borde liso. **Ojo:** Muy grande, abierto, ligeramente prominente. Sépalos verdosos, lanosos en la cara interior, triangulares, muy anchos, separados en la base donde a veces se forman pequeñas protuberancias carnosas, cóncavos y erectos, con las puntas dobladas o rizadas hacia fuera en forma de corona.

**Piel:** Muy ruda, mate, casi enteramente ruginosa. **Color:** Cobrizo-bronceado formado por el punteado ruginoso muy grande y a veces compacto sobre fondo amarillo verdoso. Extensas zonas ruginosas más lisas y oscuras alrededor del ojo y del pedúnculo y en algunas partes sobre el resto del fruto; sobre estas zonas el punteado resalta por ser de color más claro.

**Tubo del cáliz:** Grande en embudo con conducto muy corto. Interior rojizo.

**Corazón:** Tamaño medio. Largo y estrecho, romboidal. Eje muy largo, estrecho, cerrado o abierto en su mitad inferior, lanoso. Celdillas alargadas, situadas muy altas.

**Semillas:** Pequeñas. Muy estrechas y largas, forma irregular. Con espolón variable. Con frecuencia abortadas.

**Carne:** Blanco-amarillenta, verdosa bajo la epidermis.

**Maduración:** Otoño o Invierno ?.

